

HERBICIDAS

PRODUCTO Y DOSIS

EQUIP	0.120 Kgs de EQUIP® WG + 1.6 Lts de Coadyuvante Optimizer + 2 Kgs de Sulfato de Amonio
ADENGO	Todas las malezas: 1.5 - 2.0 (Lts/Ha)* + Sulfato de Amonio (Utiliza las dosis menores en los estados iniciales de crecimiento activo de las malezas). Sergio de Alepo: 2.5 - 3.5 (Lts/Ha) + Sulfato de Amonio
LIBERTY	Todas las malezas: 1.5 - 2.0 (Lts/Ha)* + Sulfato de Amonio (Utiliza las dosis menores en los estados iniciales de crecimiento activo de las malezas). Sergio de Alepo: 2.5 - 3.5 (Lts/Ha) + Sulfato de Amonio
MALEZA	
HORA ANCHA	
HOJA ANCHA	
GRAMÍNEA	
HOJA DE MELERA	
TIPO DE MELERA	
TIPO DE GRAMÍNEA	

PERCUTOR

30 a 45 Grs/Ha PERCUTOR® + 2 lts/Ha de Glifosato.

Manejo única aplicación (una Pass) para suelos livianos, baja infestación de Pasto cuáresma, Pasta de ganso y Capin. • Dosis de 0.300 lts/Ha para suelos medianos /pesados, alta infestación de Pasto cuáresma, Pasta de ganso, Pasto bandera y Capin.

Manejo Programado, Adeng en Preemergencia seguido luego de un manejo Programado, Adeng en 4ta- 5ta hora. • Dosis de 0.210 lts/Ha para suelos livianos, baja infestación de Pasto cuáresma, Pasta de ganso y Capin. • Dosis de 0.280 lts/Ha para suelos medianos /pesados, alta infestación de Pasto cuáresma, Pasta de ganso, Pasto bandera y Capin

ADENGO

Manejo única aplicación (una Pass) en Preemergencia:

• Dosis de 0.300 lts/Ha para suelos livianos, baja infestación de

Pasto cuáresma, Pasta de ganso y Capin. • Dosis de 0.400 lts/Ha para suelos medianos /pesados, alta infestación de

Pasto cuáresma, Pasta de ganso, Pasto bandera y Capin.

Manejo Programado, Adeng en Preemergencia seguido luego de un manejo Programado, Adeng en 4ta- 5ta hora. • Dosis de 0.210 lts/Ha para suelos livianos, baja infestación de Pasto cuáresma, Pasta de ganso y Capin. • Dosis de 0.280 lts/Ha para suelos medianos /pesados, alta infestación de Pasto cuáresma, Pasta de ganso, Pasto bandera y Capin

LIBERTY

Manejo única aplicación (una Pass) en Preemergencia:

• Dosis de 0.300 lts/Ha para suelos livianos, baja infestación de

Pasto cuáresma, Pasta de ganso y Capin. • Dosis de 0.400 lts/Ha para suelos medianos /pesados, alta infestación de

Pasto cuáresma, Pasta de ganso, Pasto bandera y Capin.

Manejo Programado, Adeng en Preemergencia seguido luego de un manejo Programado, Adeng en 4ta- 5ta hora. • Dosis de 0.210 lts/Ha para suelos livianos, baja infestación de Pasto cuáresma, Pasta de ganso y Capin. • Dosis de 0.280 lts/Ha para suelos medianos /pesados, alta infestación de Pasto cuáresma, Pasta de ganso, Pasto bandera y Capin

PERCUTOR

30 a 45 Grs/Ha PERCUTOR® + 2 lts/Ha de Glifosato.




ADVERTENCIA
Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto. Lea toda la etiqueta antes de usarlo.

FUNGICIDAS

PRODUCTO	PLAGA	DOSIS
Nativo	Roya común (<i>Puccinia sorghi</i>) Helmintosporiosis común (<i>Exserohilum turicum</i>)	600 - 800 ml/ha
Sphere Max	Roya común (<i>Puccinia sorghi</i>), Helmintosporiosis común (<i>Exserohilum turicum</i>)	250 a 400 ml/ha

INSECTICIDAS

PRODUCTO	PLAGA	DOSIS
Clap	Hormigas podadoras: <i>Acromyrmex</i> spp.	15 a 20 ml/ha
Alystin	Cogollero del maíz (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	100 ml/ha
Decis Flow	Orugas cortadoras (<i>Agrotis ipsilon</i> ; <i>Agrotis malefida</i>)	20 - 22.5 cc/ha
Decis Forte	Orugas cortadoras (<i>Agrotis</i> spp., <i>Porosagrotis gypaetina</i> , <i>Euxoa</i> spp.)	40-45 ml/ha
Belt	Cogollero del maíz (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	60 a 100 ml/ha



Más información en
www.cropscience.bayer.com.ar



BAYER S.A., CUIT 30-50381106-1, con domicilio en Ricardo Gutierrez 3652, Munro, Provincia de Buenos Aires. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

PROGRAMA FITOSANITARIO

MAIZ


Bayer



MAÍZ



ADENGO®

Percutor®
↔



CLAP

decis
flow

Alsystin®

decis
FORTE

BELT®

Equip ▼

Liberty®

NATIVO ▲

SPHERE MAX ▲

HERBICIDAS

Amaranthus quitensis (Yuyo colorado), Chenopodium album (Quínoa), Portulaca oleracea (Verdolaga), Anoda cristata (Malva), Raphanus sativus (Nabón), Ipomoea spp. (Bejucos), Polygonum aviculare (Cien nudos), Euphorbia spp (Lecherón), Parietaria debilis (Ocucha), Lamium amplexicaule (Lamium), Conyza bonariensis (Rama negra), Bowlesia incana (Boulesia), Viola arvensis (Pensamiento), Borreria verticillata (Botoncito blanco), Gomphrena pulcella (Siempre viva del campo), Datura ferox (Chamico), Xanthium spp (Abrojo chico y grande), Tagetes minuta (Chinchilla), Brassica campestris (Nabo), Abrojo grande (Xanthium cavanillesii), Bidens pilosa (Amor seco), Sonchus oleraceus (Cerraja), Stellaria media (Capiquí), Coronopus didimus (Mastuerzo), Verbena litorales (Verbena), Gamochaeta spicata (Peludilla), Senecio vulgaris (Senecio), Carduus acanthoides (Cardo chileno), Verónica persica (Verónica), Polygonum convolvulus (Enredadera anual), Petunia spp (Petunia), Anthemis cotula (Manzanilla), Galinsoga parviflora (Albaca silvestre), Ammis majus (Apio cimarrón), Helianthus annus (Girasol), Sorghum halepense (sorgo de Alepo de semilla y rizoma), Digitaria sanguinalis (Pasto cuaresma), Echinochloa crusgalli y Echinochloa colonum (Capín), Eleusine indica (Pata de ganso), Sorghum halepense de semilla (Sorgo de alepo de semilla), Avena negra (Avena fatua), Brachiaria spp (Pasto Bandera), Alternanthera philoxeroides (Lagunilla), Brachiaria extensa (Pasto bracharia), Cenchrus spp. (Roseta), Capsella bursa pastoris (Bolsa del pastor), Echinochloa crus galli (Capín arroz), Cirsium vulgaris (Cardo negro).

FUNGICIDAS

Roya común
Helmintosporiosis común

Roya común
Helmintosporiosis común

INSECTICIDAS

Oruga militar tardía
Orugas cortadoras
Cogollero del maíz
Hormigas podadoras
Orugas cortadoras