



## FUNGICIDAS

PRODUCTO	PLAGA	DOSIS O CONCENTRACIÓN	RECOMENDACIÓN
Nativo 300SC	Oídio del manzano y del peral ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	50 ml/hl	Iniciar los tratamientos a partir de botón rosado. Repetir cada 10 a 12 días. No reiterar las aplicaciones por más de tres veces.
Aliette 80 WP	Podredumbre de raíces ( <i>Phytophthora cactorum</i> )	250 g/100 litros de agua.	Una aplicación en el comienzo de cada brotación, repetir a los 60 días y a los 120 días después de la primera.


## HERBICIDAS

PRODUCTO	PLAGA	DOSIS O CONCENTRACIÓN	RECOMENDACIÓN
Alion 500 SC	Malezas anuales y gramíneas, bianuales en etapa de germinación y malezas perennes provenientes de semilla.	0,15 - 0,2 L/ha	Herbicida residual. Aplicar previo a la emergencia de malezas, o con malezas pequeñas recién emergidas en mezcla con Sitrin u otro.

## INSECTICIDAS

PRODUCTO	PLAGA	DOSIS O CONCENTRACIÓN	RECOMENDACIÓN
Movento 150 OD	Piojo de San José ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> )	50 - 70 ml/hl	Aplicar en forma temprana, con suficiente follaje
	Pulgón Lanigero ( <i>Erisoma lanigerum</i> ) Cochinilla Harinosa ( <i>Pseudococcus viburni</i> )	70 ml/hl	
Envidor 240 SC	Arañuela roja europea ( <i>Panonychus ulmi</i> ) Arañuela roja común ( <i>Tetranychus telarius</i> )	30 ml/100 L de agua	La aplicación debe realizarse al observar las primeras formas móviles de la plaga
Calypso 480 SC	Carpocapsa ( <i>Cydia pomonella</i> ), Grafolita ( <i>Grapholita molesta</i> ), Chicharrita ( <i>Edwardsiana crataegi</i> ), Psilido ( <i>Cacopsylla pyricola</i> ), Pulgón negro ( <i>Aphis gossypii</i> ), Pulgón verde ( <i>Myzus persicae</i> )	20 ml/hl	El producto debe ser aplicado de acuerdo a los servicios de alarma
Belt 480 SC	Gusano de la pera y la manzana, Carpocapsa ( <i>Cydia pomonella</i> ), Bicho canasto ( <i>Oiketicus platensis</i> ), Oruguita enrollador ( <i>Argyrotaenia sphaleropa</i> )	20 ml/hl	El producto debe ser aplicado de acuerdo a los servicios de alarmas

Más información en [www.cropscience.bayer.com.ar](http://www.cropscience.bayer.com.ar)



BAYER S.A., CUIT 30-50381106-1, con domicilio en Ricardo Gutierrez 3652, Munro, Provincia de Buenos Aires. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

ADVERTENCIA: Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto. Lea toda la etiqueta antes de usarlo. BAYER S.A., CUIT 30-50381106-1, con domicilio en Ricardo Gutierrez 3652, Munro, Provincia de Buenos Aires. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

# MANZANA & PERA



PROGRAMA FITOSANITARIO





# MANZANA & PERA



Proceso invernral	Yema hinchada	Puntas Verdes	Inicio Ramillete Floral	Botón rosado	Inicio de flor	Plena floración	Caída de pétalos	Cuaja de frutos	Frutos de 2.5cm pre-cosecha	Pre cosecha	Post cosecha
-------------------	---------------	---------------	-------------------------	--------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------------------	-------------	--------------



**NATIVO**

**Aliette**

**MOVENTO**

**BELT calypso**

**envydor**

**Alion**

## FUNGICIDAS



- Oidio - Sarna (Venturia)
- Podredumbre de la Raiz

## INSECTICIDAS



- Cochinilla harinosa
- Pulgon lanigero
- Pulgones
- Piojo de san José
- Carpocapsa
- Grafolita
- Enruladores
- Chicharrita
- Arañuelas
- Eriófidos
- Psílido del peral

## HERBICIDAS



Herbicida residual. Controla malezas gramíneas y hoja ancha, anuales, bianuales y perennes, provenientes de semilla.