

FUNGICIDAS

PRODUCTO	PLAGA	DOSIS O CONCENTRACIÓN	PC (días)
Nativo 300 SC	Alternaria / Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	Aspersión foliar 400 - 600 ml/Ha	30
Flint 50% WG	Tizón temprano de la papa (<i>Alternaria solani</i>)	Aspersión foliar 100-150 g/ha	15
Aliette 80% WP	Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5-2 kg/ha	19
Infinito 68,75 SC	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	Aspersión foliar Papa 1000 – 1500 ml /ha	7

INSECTICIDAS

PRODUCTO	PLAGA	DOSIS O CONCENTRACIÓN	PC (días)
Confidor 200 OD	Papa Pulgón verde del duraznero (<i>Myzus persicae</i>) Pulgón verde de la papa (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) Insectos de suelo: Gusanos blancos (<i>Diloboderus abderus</i> , <i>Cyclocephalla signaticollis</i> , <i>Maecolaspis bridarollii</i>) Gusano alambre (<i>Agriotes sp.</i>) Gorgojo del tomate (<i>Phyrdenusmuriceus</i>)	1,7 L/ha 440 ml/ha	21
Decis Forte 10 EC	Polilla de la papa (<i>Gnorimoschema operculella</i>) Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>)	Aspersión foliar 10 ml/ 100 lt agua 75cc / ha	3
Calypso 480 SC	Pulgón verde de la papa (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), pulgón verde del duraznero (<i>Myzus persicae</i>), pulgón verde de los cereales (<i>Schizapis graminum</i>), pulgón verde de la avena (<i>Rhopalosiphum padi</i>), Pulgón del algodón (<i>Aphis gossypii</i>)	150 ml/ha	14 a 21


HERBICIDAS

PRODUCTO	PLAGA	DOSIS O CONCENTRACIÓN	PC (días)
Sencorex 480 SC	Malezas latifoliadas y algunas gramíneas	1 a 1,5 lt/ha (Pre- emergencia) 0,7 a 1,0 lt/ha (Post-emergencia)	60
Select 240 EC	Gramíneas anuales Sorgo de Alepo Gramón	400 a 650 cc/ha 30 a 40 cm de altura Estolones de hasta 15 cm de largo y desarrollo foliar de 10 cm de altura	60

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

PRODUCTO	PLAGA	DOSIS O CONCENTRACIÓN	PC (días)
Presitge 29 FS	Sarna negra de la papa (<i>Rhizoctonia solani</i>) Gorgojo del tomate (<i>Phyrdenus nicotiana</i>) Gusano blanco (<i>Diloboderus abderus</i>) Gusanos alambre (<i>Agriotes spp.</i>) Gusanos blancos (<i>Maecolaspis bridarollii</i>) Pulgón verde de la papa (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) Pulgón verde del duraznero (<i>Myzus persicae</i>)	2,5 lt/ha	NC
Confidor 200 OD	Papa Pulgón verde del duraznero (<i>Myzus persicae</i>) Pulgón verde de la papa (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>) Insectos de suelo: Gusanos blancos (<i>Diloboderus abderus</i> , <i>Cyclocephalla signaticollis</i> , <i>Maecolaspis bridarollii</i>) Gusano alambre (<i>Agriotes sp.</i>) Gorgojo del tomate (<i>Phyrdenusmuriceus</i>)	1,7 L/ha 440 ml/ha	21

Más información en www.cropscience.bayer.com.ar



BAYER S.A., CUIT 30-50381106-1, con domicilio en Ricardo Gutierrez 3652, Munro, Provincia de Buenos Aires. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

ADVERTENCIA. Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto. Lea toda la etiqueta antes de usarlo. BAYER S.A., CUIT 30-50381106-1, con domicilio en Ricardo Gutierrez 3652, Munro, Provincia de Buenos Aires. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.





Plantación



Brotación



Desarrollo de primeras hojas



Formación de brotes laterales



Elongación de tallo principal



Formación de tubérculos



Inicios de flor



Plena flor



Desarrollo de tubérculos



Senescencia



Prestige

TRATAMIENTO SEMILLAS

Rizoctonia, insectos de suelo, sarna negra de la papa, gorgojo del tomate, gusano blanco, gusanos alambre, pulgón verde de la papa, pulgón verde del duraznero



FLINT

NATIVO

INFINITO

Aliette

Confidor OD

caLypso

decis FORTE

Sencorex

select

FUNGICIDAS

Tizón temprano de la papa (Alternaria solani)

Tizón Tardío (Phytophthora infestans)

INSECTICIDAS

Insectos chupadores
Pulgones / Otros

Polilla de la papa (Gnorimoschema operculella) pulgón verde.

HERBICIDAS

Malezas latifoliada y algunas gramíneas

Gramíneas anuales. Sorgo de Alepo y gramón

PAPA