



ADVERTENCIA

Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto. Lea toda la etiqueta antes de usarlo.

FUNGICIDAS

| PRODUCTO | ENFERMEDADES | DOSIS O CONCENTRACIÓN | PC (días) |
|--------------------------|--|---|-----------|
| Nativo 300 SC | Oidiopsis (<i>Leveillula taurica</i>) Moho gris de la hoja del tomate (<i>Cladosporium fulvum</i>) Tizón del tomate (<i>Alternaria app.</i>) | Aspersión foliar 100 ml / 100 lt agua | 3 |
| Infinito 68,75 SC | Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>) Complejo Hongos del suelo (<i>Phyitium spp</i> y <i>Phytophthora spp</i>) | Aspersión foliar 250 ml / 100 lt agua Mínimo: 1,5 lt / ha Inmersión bandejas: 250 ml/hl Riego por goteo: 1,5-2 Lha Drench: 15-20 ml/ 10 litros de agua | 7 |
| Aliette 80 WP | Mildiú del tomate (<i>Phytophthora infestans</i>) | 2 kg / ha Comenzar con la aparición de síntomas y repetir cada 15 días. | 15 |

INSECTICIDAS

| PRODUCTO | PLAGAS | DOSIS O CONCENTRACIÓN | PC (días) |
|--|---|--|-----------|
| Confidor 200 OD | Mosca blanca (<i>Bermisia sp.</i> , <i>Aleurothrixus sp.</i> , <i>Trialeurodes sp.</i>) | Riego x goteo 1,7 a 2,6 lt / ha Planta a planta 60 ml / 100 lt agua Aspersión foliar 50 - 90 ml / 100 lt agua | 3 |
| Movento 150 OD <small>DOBLE SISTEMA - ACCIÓN RESIDUAL PROLONGADA</small> | Mosca blanca (<i>Bemisia sp.</i> , <i>Aleurothrixus sp.</i> , <i>Trialeurodes sp.</i>) | Aspersión foliar 60 ml / 100 lt agua | 2 |
| Alsystin 48 SC | Polilla del tomate (<i>Tutta absoluta</i>) | Aspersión foliar 30 ml / 100 lt agua | 7 |
| Decis Forte 10EC | Gusano grasiento (<i>Agrotis ipsilon</i>) | Aspersión foliar 15 ml / 100 lt agua | 3 |
| Belt 180 SC | Polilla del tomate (<i>Tuta absoluta</i>) | Aspersión foliar 15 ml / 100 lt agua | 5 |
| Solomon 300 OD <small>SISTEMA ASCENDENTE VOLTEO</small> | Mosca blanca (<i>Bemisia sp.</i> , <i>Trialeurodes sp.</i>) | Aspersión foliar 60 a 90ml / 100 lt Agua | 2 |

HERBICIDAS

| PRODUCTO | PROBLEMAS | DOSIS O CONCENTRACIÓN | PC (días) |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|
| Sencorex | Malezas latifoliadas | 0,7 lt / ha Pre y post transplante | 60 |

Más información en www.cropscience.bayer.com.ar



BAYER S.A., CUIT 30-50381106-1, con domicilio en Ricardo Gutierrez 3652, Munro, Provincia de Buenos Aires. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.



PROGRAMA FITOSANITARIO

PREVENCIÓN





EL TOMATE



FUNGICIDAS

INFINITO
Bandejas/ Drench/ Goteo



Aliette
Aplicación foliar

INFINITO
Aplicación foliar

NATIVO
Aplicación foliar

- Dumping off
- Tizón tardío
- Oídio/ Alternaria/ Fulvia

INSECTICIDAS

Confidor
Bandejas/ Drench/ Goteo

MOVENTO
DOBLE SISTEMA - ACCIÓN RESIDUAL PROLONGADA

SOLOMON
SISTEMIA ASCENDENTE VOLTEO

Alsystin **decis FORTE** **BELT**
Aplicación foliar

- Insectos chupadores
Mosquita blanca / Pulgones / Trips / Minadores
- Insectos masticadoras
Gusanos cortadores / Polilla del tomate

HERBICIDAS

Sencorex

Control de malezas latifoliadas en pre y post transplante. Sólo para tomate cultivado a campo