



### ADVERTENCIA

Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto. Lea toda la etiqueta antes de usarlo.

## FUNGICIDAS

| PRODUCTO             | ENFERMEDADES   | DOSIS O CONCENTRACIÓN | RECOMENDACIÓN  |
|----------------------|--|-----------------------|--|
| <b>Nativo 300 SC</b> | Podredumbre morena de los frutales ( <i>Monilinia fructicola</i> y <i>Monilinia laxa</i> ) | 62,5 ml/hl            | En la etapa final del crecimiento de los frutos realizar 2 aplicaciones 30 y 15 a 7 días antes de cosecha. |

## INSECTICIDAS

| PRODUCTO                 | PLAGAS  | DOSIS O CONCENTRACIÓN                        | RECOMENDACIÓN   |
|--------------------------|---|--|---|
| <b>Calypso 480 SC</b>    | Polilla de la manzana<br>Langostino del manzano<br>Chanchitos blancos<br>Escama de San José                   | 20 cc/hl<br>20 cc/hl<br>25 cc/hl<br>25 cc/hl | El producto debe ser aplicado de acuerdo a los servicios de alarma. |
| <b>Movento 150 OD</b>    | Polilla de la manzana<br>Langostino<br>Chanchitos blancos<br>Escama de San José<br>Pulgón lanígero de manzano | 100 cc/hl<br>(dosis mínima 1,5 l/ha)         | Aplicar en forma temprana.  |
| <b>Envidor 240 SC</b>    | Huevos, larvas, ninfas y adultos de arañas  | 40-60 cc/hl                                  | Aplicar en forma temprana.  |
| <b>Belt 480 SC</b>       | Gusano del brote del duraznero ( <i>Grafolita molesta</i> )   | 30 ml/hl                                     | El producto debe ser aplicado de acuerdo a los servicios de alarma. |
| <b>Decis Forte 10 ES</b> | Pulgón verde ( <i>Myzus persicae</i> )<br>Gusano del durazno ( <i>Grapholita molesta</i> )                    | 5 ml/hl<br>4 - 5 ml/hl                       | El producto debe ser aplicado de acuerdo a los servicios de alarma. |


## HERBICIDAS

| PRODUCTO            | PROBLEMAS  | DOSIS O CONCENTRACIÓN | RECOMENDACIÓN   |
|---------------------|--|-----------------------|---|
| <b>Alion 500 SC</b> | Malezas anuales y gramíneas, bianuales en etapa de germinación y malezas perennes provenientes de semilla. | 0,15 - 0,2 L/ha       | Herbicida residual. Aplicar previo a la emergencia de malezas, o con malezas pequeñas recién emergidas en mezcla con Sitrin u otro. |

Más información en [www.cropscience.bayer.com.ar](http://www.cropscience.bayer.com.ar)



BAYER S.A., CUIT 30-50381106-1, con domicilio en Ricardo Gutierrez 3652, Munro, Provincia de Buenos Aires. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.



PROGRAMA FITOSANITARIO

CAMAROS





# CARROZOS



|                 |               |              |              |                 |                  |                 |                       |             |         |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------|
| Receso invernal | Yema hinchada | Boton rosado | Inicios Flor | Plena Floracion | Caída de pétalos | Cuaja de frutos | Crecimiento de Frutos | Pre cosecha | Cosecha |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------|



NATIVO



Confidor OD



MOVENTO



decis BELT caLypso



envidor



Alion



## FUNGICIDAS



Oidio  
Monilia  
Poscosecha

## INSECTICIDAS



Pulgones  
Piojo de San José, Cochinillas, Pulgones  
Grafolita ó Polilla Oriental  
Arañuelas

## HERBICIDAS



Herbicida residual. Controla malezas gramíneas y hoja ancha, anuales, bianuales y perennes, provenientes de semilla.