



FUNGICIDAS

PRODUCTO	ENFERMEDADES	RECOMENDACIÓN	DOSIS	PC (días)
Flint 50% WG	Naranja, Limón, Pomelo Mancha negra de los cítricos (<i>Guignardia citricarpa</i>)	La aplicación debe ser realizada a partir de los 60 días posteriores a la caída de los pétalos y hasta un máximo de 90 días de dicho período Fenológico. Revisar etiqueta en caso de aplicaciones en bajo volumen.	10 g/hl	30
	Mandarina (Satsuma, Clemenule) Sarna de los Citrus (<i>Elsinoe australis</i>)			
	Mandarina (Tangor, Murcott, Nova) Alternaria (<i>Alternaria sp pv citri</i>)			
Serenade ASO	Limón y Naranja Mancha negra (<i>Guignardia citricarpa</i>)	Se recomiendan aplicaciones mensuales desde Octubre hasta cosecha.	4 L/ha	0
	Mandarina Mancha negra (<i>Guignardia citricarpa</i>) Alternaria (<i>Alternaria Alternata pv. Citri</i>)			
Aliette 80% WP	Gomosis de los Cítricos (<i>Phytophthora parasitica</i>) (<i>Phytophthora cithrothpora</i>)	La aplicación al comienzo de cada brotación. Repetir a los 60 días y una tercera aplicación a los 120 días de la primera.	250 g/100 L de agua 45 (10 a 20 L de agua x árbol adulto).	45
		Cancros: Aplicar periódicamente hasta la cicatrización de los canchros.	Pintado de canchros 500 g/1 L de agua.	

INSECTICIDAS

PRODUCTO	PLAGAS	RECOMENDACIÓN	DOSIS	PC (días)
Confidor 200 OD	Naranja, Limón, Pomelo Minador de los cítricos (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	3,5 - 5 ml por planta menor a 5 años de Edad - 25 ml de solución por plantín 90-170 ml/100 L de agua (5 L de solución por planta y por metro de altura).	1,3 - 2,6 L/ha en plantas de 2 a 5 años.	7
	Mandarina, Naranja, Limón (<i>Diaphorina citri</i>)		30 ml/100 L de agua (2L de solución por planta).	
Envidor 240 SC	Naranja y Mandarina	Realzar la aplicación ante la presencia de los primeros ácaros, una vez por año. Posteriormente si es necesaria una segunda aplicación, rotar con otros acaricidas de diferente modo de acción (tetradifon, abamectina, etc). No usar subdosis.	Leptra 20 ml/100 L de agua	60
	Ácaro de la lepra (<i>Brevipalpus sp</i>)		Tostado 20-25 ml/100 L de agua. Dosis mínima de 400 ml/ha	
	Ácaro del Tostado (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)			

HERBICIDAS

PRODUCTO	PROBLEMAS	RECOMENDACIÓN	DOSIS	PC (días)
Alion 500 SC	Herbicida suelo activo, no selectivo de prolongado efecto residual que controla malezas anuales gramíneas y de hoja ancha en germinación, tanto de otoño - invierno como primavera - verano, como así algunas binales provenientes de semillas.	Aplicar siempre en mezcla con glifosato. Utilizar volumen de agua de 150 L/ha. Procurar utilizar equipos adecuados de manera de lograr una distribución homogénea del herbicida sobre la superficie tratada.	150-200 ml/ha tratada	NC

Más información en www.cropscience.bayer.com.ar



BAYER S.A., CUIT 30-50381106-1, con domicilio en Ricardo Gutierrez 3652, Munro, Provincia de Buenos Aires. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

ADVERTENCIA. Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto. Lea toda la etiqueta antes de usarlo. BAYER S.A., CUIT 30-50381106-1, con domicilio en Ricardo Gutierrez 3652, Munro, Provincia de Buenos Aires. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.



PROGRAMA FITOSANITARIO

OSCOLOS





Brotación Botón Pre Flor Floración Caída de Pétalos Cuaja Fruto en Crecimiento Cosecha

FUNGICIDAS




Mancha negra
(*Guinardia citricarpa*)

Phytophthora



INSECTICIDAS



Afidos, mosquita blanca
Diaphorina, cochinillas



Arañuelas



HERBICIDAS



Herbicida residual. Controla malezas gramíneas y hoja ancha, anuales bianuales y perennes, provenientes de semilla.

CITRICOS

